

Wintergerste

0,8 l / ha VERBEN

1,0 l / ha HINT

1,0 l / ha BALAYA  
+ 1,5 l/ha MOREX

Winterweizen

0,8 l / ha VERBEN

1,0 l / ha HINT

1,6 – 2,0 l / ha UNIVOQ

1,0 l / ha BALAYA  
+ 1,5 l / ha MOREX

AVASTEL PACK  
1,5 l / ha + 0,75 l / ha

0,8 l / ha HINT

0,8 l / ha ABRAN  
+ 0,8 l / ha AZOXY

1,2 l / ha SOLEIL

1,0 l / ha LYNX

Wintertriticale

0,6 - 0,8 l / ha VERBEN

0,8 l / ha BALAYA  
+ 1,2 l / ha MOREX

1,5 l / ha UNIVOQ

Winterroggen

1,0 l / ha LYNX

0,8 l / ha BALAYA  
+ 1,2 l / ha MOREX

1,5 l / ha UNIVOQ

Hafer

1,0 l / ha HINT



Bitte beachten Sie die NT, NW, NG Auflagen etc.  
 Alle Angaben verstehen sich pro ha! Vor Anwendung Bedingungen und Verträglichkeit prüfen!  
 Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko. Pflanzenschutzmittel sicher verwenden.  
 Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen !

Sicherheitsdatenblätter zu allen Pflanzenschutzmitteln finden Sie unter: [www.bv-agrar.de/sicherheitsdatenblätter](http://www.bv-agrar.de/sicherheitsdatenblätter)



**NORBERT WIRTZ** Agrarhandel

Bornheim-Sechtem: Tel 022 27 / 99 18 70  
 Wachtberg-Villip: Tel 0228 / 60 88 45 50

[www.wirtz-agrar.de](http://www.wirtz-agrar.de)

Fungizid	Wirkstoff	Wirkstoffgehalt g/kg bzw. l	Wirkstoff nach FRAC	zugel. Anwendungszeitraum (BBCH)	max. zugel. Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	Wirkung auf														zugelassen in					max. Anzahl zugel. Anwendungen	Besonderheiten			
						Halbbruch	Mehltau		Septoria		DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Zweigrost	Rynchosporium	Netzflecken*	Ramularia/PLS	W-Weizen	W-Gerste	Roggen	Triticale	Hafer						
							Stopwirkung	Dauerwirkung	Septoria nodorum	protektiv(vorbeugend)														kurativ(heilend)			W-Weizen	W-Gerste	Roggen
Azole (DMI - Fungizide - haben unterschiedlich starke protektive, i.d.R. hauptsächlich kurative Wirkung)																													
<b>Abran/Bolt ADA/FoGrp</b>	Prothioconazol	250	G1	30-71 30-69 HA: bis 61	0,8	xx	x	x(x)	xxx	xx	xx	xx(x)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	-	x nur WR	x	-	x	-	x	3 (14-21 T.) 4 (14-21 T.)	NT850, VA277 DL:NT140
<b>Folicur/Lynx BCSD</b>	Tebuconazol	250	G1	25-61	1,0 G, WR: 1,25	-	x	x(x)	xx	x(x)	x	x	xx	xxx	x	xxx	x	x	-	x	x	x	-	-	-	-	2	-	
<b>Hint</b>	Prothioconazol Spiroxamine	300 160	G2, G1	30-61	1,25	xx	xx	xx	xxx	xx	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	x	x	x	x	x	2 (14-21 T.)	VA277	
<b>Soleil NUF</b>	Tebuconazol Bromuconazol	107 167	G1	30-69	1,2	-	(x)	x	xx	x	(x)	(x)	xx	xx	xx	xx	-	-	-	x	-	-	-	-	-	1	-		
<b>Verben COR</b>	Proquinazid Prothioconazol	50 200	E1 G1	W, Tl: 30-65 G, WR: WW 30-49	1,0	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xx(x)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	x	x WR	x WT	-	-	1	-		
Strobilurine (QoI - Fungizide - wirken i.d.R. überwiegend protektiv)																													
<b>Azoxy</b>	Asoxystrobin	250	C3	31-69 G, HA: 31-59	1,0	-	-	(x)	xxx	-	-	xx	xx	xxx	-	xxx	x(x)	xx	-	x	x	x	x	x	x	2 (min. 14 T.)	-		
<b>Balaya BASF</b>	Revsol (Mefentrifluconazole) Pyraclostrobin	100 100	G1, C3	30-61	1,5	-	x	x	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	-	xxx	xx	xxx	xx	x	x	x	x	-	-	2 (min. 14 T.)	-		
<b>Comet BASF</b>	Pyraclostrobin	200	C3	25-61	1,25	-	-	(x)	xxx	-	-	xx	xx	xxx	-	xxx	xx	xxx	-	x	x	x	x	-	-	2 (min. 14 T.)	NT140		
Carboxamidhaltige Fungizide (SDHI-Fungizide - meistens zeigen sie eine überwiegend vorbeugende Wirkung, einige haben auch eine heilende Wirkung) - bei nicht SDHI sensitiven Netzfleckenstämmen, kann es zu deutlichen Minderwirkung in Gerste auf Netzflecken kommen																													
<b>Revytrex BASF</b>	Revsol (Mefentrifluconazole) Fluxapyroxad	66,7 66,7	G1, C2	30-61	1,5 WR, Tl, HA: 1,125	x(x)	x	x(x)	xxx	xxx	xxx	x(x)	xxx	xxx	-	xxx	xx	xx	xx	x	x	x	x	x	-	2 (min. 14 T.)	-		
Picolinamid-haltige Einzelprodukte																													
<b>Univoq COR</b>	Prothioconazol Fenpicoxamid	100 50	G1, C4	41-69	2,0 R, Tl: 1,5	-	x	x(x)	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	-	xxx	-	-	x	-	x	x	-	1	-			
Packs																													
<b>Avastel Pack (Pioli + Soratel) ADA</b>	Fluxapyroxad Prothioconazol	62,5 250	C2, G1	30-61	1,5 + 0,75	xx	x	x	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	x	xxx	xxx	xxx	xx	x Welch weizen	x	x	x	x	-	1	NT140		
<b>Balaya + Morex BASF</b>	Revsol (Mefentrifluconazole) Pyraclostrobin Fluxapyroxad	100 100 62,5	G1 C2 C3	30-61	1,0 + 1,5 WR, Tl: 0,8 + 1,2	x(x)	x	x(x)	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xx	x	x	x	x	-	2 (min. 21 T.)	-			

xxx = sehr gute Wirkung xx = gute Wirkung x = geringe Wirkung (x) = Teilwirkung - = keine Wirkung \*Minderwirkung bei Resistenzen möglich



**NORBERT WIRTZ** Agrarhandel

Bornheim-Sechtem: Tel 022 27 / 99 18 70

Wachtberg-Villip: Tel 0228 / 60 88 45 50

[www.wirtz-agrar.de](http://www.wirtz-agrar.de)