




NORBERT WIRTZ

Agrarhandel

Bornheim-Sechtem: Tel 022 27 / 99 18 70

Wachtberg-Villip: Tel 0228 / 60 88 45 50

www.wirtz-agrar.de

Alle Angaben verstehen sich pro ha! Vor Anwendung Bedingungen und Verträglichkeit prüfen!
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko. Pflanzenschutzmittel sicher verwenden!
Sicherheitsdatenblätter zu allen Pflanzenschutzmitteln finden Sie unter: <https://der-agrarhandel.de/sicherheitsdatenblaetter/>

Bitte beachten Sie die NT, NW, NG Auflagen etc.

Herbizid	Wirkstoff	Wirkstoffgehalt g/kg bzw. l	Formulierung	Wirkort nach HRAC (alt/neu)A	zugel. Anwendungszeitraum (BBCH NAF)	max. zugel. Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	Wirkung auf																Drain-Auflage	weitere Auflagen		
							Ackerfuchsschwanz	Weidelgras	Ackerhellerkraut	Ehrenpreis	Hirtengräse	Hundskerbel	Kamille	Klatschnoh	Klettenlabkraut	Kornblume	Schierling	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Vogelmiere	Besenraute	Wegraute				
Vorlauf und früher Nachlauf																										
Butisan Gold BASF	Dimethenamid-P Metazachlor Quinmerac	200 200 100	SE	K3;O (15,4)	VA-18	2,5	xx	xx	xx	xx(x)	xx(x)	x	xx(x)	xx	xxx	x	xx	-	xx(x)	xxx	xx	-	-	-	NG301-1, NG346, WP734	
Fuego Top ADA	Metazachlor Quinmerac	375 125	SC	K3;O (15,4)	VA-14	2,0	x	xx	x(x)	xx(x)	x(x)	x	xx(x)	x(x)	xx	x	xx	(x)	x	xx	xx	x	-	-	NG301-1, NG343, NG346, VV215, WP734	
Rapsan 500 PLA	Metazachlor	500	SC	K3 (15)	VA-12	1,5	x	xx	x	(x)	x(x)	-	x(x)	x	x	-	-	x	-	x(x)	xx	x	-	-	NG301-1, NG346-1, WP734	
Runway VA/ Synero 30 SL COR	Aminopyralid	30	SL	O (4)	VA-18	VA:0,2 NA: 0,267	-	-	x	-	(x)	-	xx	xx	(x)	xx	(x)	(x)	-	-	(x)	(x)	-	-	NG349, WP682-2, WP683-2, WP685-2, WP711, WP734	
Nachlauf																										
Belkar COR	Halauxifenmethyl Picloram	10 48	EC	O (4)	12-18 16-18	2 x 0,25 0,5	-	-	xx(x) xx	x(x) x(x)	xx xx	x(x) x(x)	xx x(x)	xxx xxx	xx(x) xx(x)	xx xx	x x	xxx xx	x(x) x(x)	x(x) x(x)	x(x) x	-	-	-	VA273-1, WP734	
LaDiva (Belkar + Synero 30 SL) COR	Halauxifenmethyl Picloram Aminopyralid	10 48 32	EC	O (4)	12-19	0,25	-	-	xx(x)	x(x)	xx(x)	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	-	-	NG 371.1055, NG 373.1055, WP682-2, WP683-2, WP685-2, WP711, WP734	
LaDiva + Belkar (Splitting)	Halauxifenmethyl Picloram Aminopyralid	10 48 30	EC SL	O (4)	12-19 16-18	0,5 + 0,25	-	-	xx(x)	x(x)	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	x	xxx	xx(x)	xxx	x	-	-	NG349, VA273-1, WP682-2, WP683-2, WP685-2, WP711, WP734	
Kerb Flo COR	Propyzamid	400	SC	K1 (3)	ab 14	1,875 1,25	xxx	xxx xx	-	xx(x)	-	-	-	-	-	-	-	(x)	-	xx	-	-	-	-	-	
		Wirkstoffgehalt g/kg bzw. l	Formulierung	Wirkort nach HRAC (alt/neu)A	zugel. Anwendungszeitraum (BBCH NAF)	max. zugel. Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	Ackerfuchsschwanz Austallgetreide Austallgerste Jährige Risp Quecke Weidelgras Windhalm								Drain-Auflage	Weitere Auflagen	HINWEISE Anwendung LADIVA BELKAR Der Anwendungstermin orientiert sich am Entwicklungsstadium der Kultur. Bei verzeltelem Auflauf der Kultur mit der Anwendung warten, bis die schwächsten Pflanzen im Bestand das BBCH-Stadium 12 (2 voll entfaltete Laubblätter) erreicht haben. + Mischungen mit Insektiziden und Bor sind immer möglich + Eine Mischung mit Select oder mit Panarex ist zum 1. Splittingtermin möglich + Eine Mischung von 0,25 l/ha Belkar mit Wachstumsreglern zum 2. Splittingtermin ist möglich mit: Tilmor®¹ (0,75-1 l/ha), Folicur®¹ (0,5-0,75 l/ha) - Kein Einsatz von Metconazol-haltigen Produkten (Carax, Caramba, ...)									
Herbizid	Wirkstoff																									
FOP's = keine Wirkung auf resistenten Ackerfuchsschwanz und resistente Weidelgräser																										
Panarex UFL	Quizalofop-P	31,81	EC	1,25 -	n.z. 2,25	NAH	xx xx	xx xx	xx xx	n.z. n.z.	n.z. xx(x)	xx xx	xxx xxx		-	-										
Select 240 EC + Radiamix UFL	Clethodim	240	EC	0,5 + 1,0	n.z.	13-29	xxx	x(x)	xx	xxx	n.z.	xx	xxx		-	WP374										

xxx = sehr gute Wirkung xx = gute Wirkung x = geringe Wirkung (x) = Teilwirkung _ = keine Wirkung

HINWEISE Anwendung LADIVA BELKAR
 Der Anwendungstermin orientiert sich am Entwicklungsstadium der Kultur. Bei verzetteltem Auflauf der Kultur mit der Anwendung warten, bis die schwächsten Pflanzen im Bestand das BBCH-Stadium 12 (2 voll entfaltete Laubblätter) erreicht haben.
 + Mischungen mit Insektiziden und Bor sind immer möglich
 + Eine Mischung mit Select oder mit Panarex ist zum 1. Splittingtermin möglich
 + Eine Mischung von 0,25 l/ha Belkar mit Wachstumsreglern zum 2. Splittingtermin ist möglich mit: Tilmor[®] (0,75-1 l/ha), Folicur[®] (0,5-0,75 l/ha)
 - **Kein Einsatz** von Metconazol-haltigen Produkten (Carax, Caramba, ...) im Herbst, die Frühjahrsanwendung ist hiervon nicht betroffen!

Bitte beachten Sie die NT, NW, NG Auflagen etc.

Alle Angaben verstehen sich pro ha! Vor Anwendung Bedingungen und Verträglichkeit prüfen!

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko. Pflanzenschutzmittel sicher verwenden!

Sicherheitsdatenblätter zu allen Pflanzenschutzmitteln finden Sie unter: www.bv-agrar.de/sicherheitsdatenblätter

NORBERT WIRTZ

Agrarhandel